



MEDIDAS PREVENTIVAS NO MANEXO DE CASO POSIBLE DO COVID-19 EN ATENCIÓN PRIMARIA

DEFINICIÓN

Ligazón

Se o caso posible se identifica nunha consulta, seguiranse as recomendacións que se indican:

- A. Entregaráselle ao paciente unha máscara cirúrxica, que sempre deberá levar posta, e recomendaranlle que hixiene de mans.
- B. A persoa que identifica o caso tamén se colocará unha máscara cirúrxica e acompañará o caso a un cuarto illado do resto dos pacientes e do persoal do centro; cuarto que, se é posible, debe ter unha xanela para ventilo despois de atender ao paciente.
- C. Se o paciente ten criterio clínico de gravidade, debe ser levado ao hospital. Será o 061 quen organice o traslado.
- D. Se o paciente non presenta criterio clínico de gravidade, deberase realizar unha avaliación clínica para determinar a necesidade ou non de derivación.
- E. Se o paciente ten que ser explorado, utilizarase o seguinte equipo de protección: Máscara cirúrxica ou FFP2, luvas, bata e protección ocular antisalpicaduras.
- F. O equipo será retirado coidadosamente, sen sacudilo, para evitar que se xeren aerosois, e colocarse nunha bolsa dobre para refugar máis tarde como refugallo de Clase III.
- G. Evitarase toda atención médica que non sexa estritamente necesaria.
- H. É moi importante realizar unha hixiene de mans adecuada, antes e despois do contacto directo co caso ou despois do contacto con obxectos persoais ou da contorna do caso; e polo tanto sempre antes e despois de usar o equipo de protección. Se as mans están visiblemente sucias, deben lavarse con auga e xabón.
- I. Para relacionarse co caso, mantéñase afastado máis de dous metros e use unha máscara cirúrxica, evite o contacto con superficies potencialmente contaminadas e realice hixiene das mans ao saír do cuarto.



- J. Débese evitar que o caso contacte con outras persoas; pero se o paciente necesita un acompañante (paciente pediátrico ou dependente), el ou ela usará unha máscara cirúrxica, luvas e unha bata.
- K. É moi importante que tanto o paciente como o acompañante tamén realicen unha hixiene correcta de mans.
- L. No centro de saúde, unha vez que finalice a asistencia, limparase a sala onde se illou o caso e os lugares cos que tivo contacto (sala de espera, consultorio médico,...), seguindo as recomendacións establecidas polo servizo de Medicina Preventiva da área correspondente. O cuarto debe ventilarse durante unha hora antes da limpeza.
- M. Se finalmente o paciente necesita ser derivado ao hospital, será o 061 quen organizará o traslado. O 061 encargarse de comunicalo ao hospital. Se o paciente non necesita ser trasladado ao hospital, quedará en illamento domiciliario.
- N. Desde a área sanitaria organizarase a toma de mostra, que se realizará no fogar do paciente, como se especificou anteriormente.